Heckealgebren

Jan Kohlhaase

Fakultät für Mathematik
Universität Duisburg-Essen

Antrittsvorlesung

$$T_w T_{w'} = \begin{cases} T_{ww'} & \text{falls } \ell(ww') = \ell(w) + \ell(w') \\ (t-1)T_w + t & \text{falls } w = w' \in S \end{cases}$$

Inhalt des Vortrags

I. Historische Entwicklung

II. Darstellungen und Heckemoduln

III. Iwahori-Hecke-Algebren

IV. Anwendungen

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)
- 1910 Promotion in Göttingen (Hilbert)

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)
- 1910 Promotion in Göttingen (Hilbert)
- 1912 Habilitation in Göttingen

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)
- 1910 Promotion in Göttingen (Hilbert)
- 1912 Habilitation in Göttingen
- 1919–1947 Universität Hamburg

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)
- 1910 Promotion in Göttingen (Hilbert)
- 1912 Habilitation in Göttingen
- 1919–1947 Universität Hamburg
- gestorben 1947 in Kopenhagen

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)
- 1910 Promotion in Göttingen (Hilbert)
- 1912 Habilitation in Göttingen
- 1919–1947 Universität Hamburg
- gestorben 1947 in Kopenhagen

Arbeitsgebiet

- analytische & algebraische Zahlentheorie

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)
- 1910 Promotion in Göttingen (Hilbert)
- 1912 Habilitation in Göttingen
- 1919–1947 Universität Hamburg
- gestorben 1947 in Kopenhagen

Arbeitsgebiet

- analytische & algebraische Zahlentheorie
- Theorie der Modulformen

I. Historische Entwicklung

Oberwolfach Photo Collection
©L. Reidemeister

Erich Hecke

- geboren 1887 in Buk (Provinz Posen)
- 1910 Promotion in Göttingen (Hilbert)
- 1912 Habilitation in Göttingen
- 1919–1947 Universität Hamburg
- gestorben 1947 in Kopenhagen

Arbeitsgebiet

- analytische & algebraische Zahlentheorie
- Theorie der Modulformen
- Querverbindungen!

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- *Transformationsverhalten:* $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- *Transformationsverhalten:* $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$
- *Holomorphiebedingungen*

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- *Transformationsverhalten:* $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$
- *Holomorphiebedingungen*

$$\rightsquigarrow \text{Periodizität: } f(z) = f(z+1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$$

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- *Transformationsverhalten:* $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$
- *Holomorphiebedingungen*

↪ *Periodizität:* $f(z) = f(z+1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$

↪ *Dirichletreihe:* $L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$ konvergiert für $\text{Re}(s) \gg 0$

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- *Transformationsverhalten:* $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$
- *Holomorphiebedingungen*

$$\rightsquigarrow \text{Periodizität: } f(z) = f(z+1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$$

$$\rightsquigarrow \text{Dirichletreihe: } L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} \text{ konvergiert für } \text{Re}(s) \gg 0$$

Eine geeignet normalisierte Reihe $\Lambda(s, f)$

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- *Transformationsverhalten:* $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$
- *Holomorphiebedingungen*

$$\rightsquigarrow \text{Periodizität: } f(z) = f(z+1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$$

$$\rightsquigarrow \text{Dirichletreihe: } L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} \text{ konvergiert für } \text{Re}(s) \gg 0$$

Eine geeignet normalisierte Reihe $\Lambda(s, f)$

- besitzt eine meromorphe Fortsetzung in die gesamte komplexe Ebene

- $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ komplexe obere Halbebene
- $\text{GL}_2(\mathbb{R})^+ = \{g \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \mid \det(g) > 0\}$ operiert auf $\mathbb{H}$

Modulformen vom Gewicht $k \in \mathbb{N}$

Funktionen $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ mit gewissen Zusatzeigenschaften:

- *Transformationsverhalten:* $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$
- *Holomorphiebedingungen*

$$\rightsquigarrow \text{Periodizität: } f(z) = f(z+1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$$

$$\rightsquigarrow \text{Dirichletreihe: } L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} \text{ konvergiert für } \text{Re}(s) \gg 0$$

Eine geeignet normalisierte Reihe $\Lambda(s, f)$

- besitzt eine meromorphe Fortsetzung in die gesamte komplexe Ebene
- erfüllt eine Funktionalgleichung der Form $\Lambda(s, f) = \Lambda(k-s, f)$.

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsches Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsche Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsche Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsche Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsche Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

- Zusätzliche Eigenschaft: Produktentwicklung

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsche Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

- Zusätzliche Eigenschaft: Produktentwicklung
z.B. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsches Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

- Zusätzliche Eigenschaft: Produktentwicklung
z.B. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \leftarrow \text{arithmetischen Ursprungs}$

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsches Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

- Zusätzliche Eigenschaft: Produktentwicklung
z.B. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \leftarrow \text{arithmetischen Ursprungs}$

Heckeoperatoren und Eulerprodukte

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsche Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

- Zusätzliche Eigenschaft: Produktentwicklung
z.B. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \leftarrow \text{arithmetischen Ursprungs}$

Heckeoperatoren und Eulerprodukte

- Raum der Modulformen $\hookrightarrow$ Algebra paarweise kommutierender Operatoren

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsche Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

- Zusätzliche Eigenschaft: Produktentwicklung
z.B. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \leftarrow \text{arithmetischen Ursprungs}$

Heckeoperatoren und Eulerprodukte

- Raum der Modulformen $\hookrightarrow$ Algebra paarweise kommutierender Operatoren
- $L(s, f)$ besitzt Produktentwicklung $\iff f$ ist gemeinsamer Eigenwert

Dirichletreihen in der arithmetischen Geometrie

- Riemannsches Zetafunktion: $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$
- L-Reihe $L_E(s)$ einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$
- u.v.m.

Problem der Modularität

Kommen diese Dirichletreihen von Modulformen her?

- Zusätzliche Eigenschaft: Produktentwicklung
z.B. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \leftarrow \text{arithmetischen Ursprungs}$

Heckeoperatoren und Eulerprodukte

- Raum der Modulformen $\hookrightarrow$ Algebra paarweise kommutierender Operatoren
- $L(s, f)$ besitzt Produktentwicklung $\iff f$ ist gemeinsamer Eigenwert

E. Hecke: Über Modulfunktionen und die Dirichletschen Reihen mit Eulerscher Produktentwicklung, *Math. Ann.* **114**, No. 1, 1–28, (1937)

II. Darstellungen und Heckemoduln

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe
- K ein Körper

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe
- K ein Körper
- V ein K -Vektorraum

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe
- K ein Körper
- V ein K -Vektorraum
- $G \rightarrow \text{Aut}_K(V)$ ein Gruppenhomomorphismus (" K -lineare G -Darstellung")

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe
- K ein Körper
- V ein K -Vektorraum
- $G \rightarrow \text{Aut}_K(V)$ ein Gruppenhomomorphismus (" K -lineare G -Darstellung")

Beispiel

- $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})^+$

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe
- K ein Körper
- V ein K -Vektorraum
- $G \rightarrow \text{Aut}_K(V)$ ein Gruppenhomomorphismus (" K -lineare G -Darstellung")

Beispiel

- $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})^+$
- $K = \mathbb{C}$

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe
- K ein Körper
- V ein K -Vektorraum
- $G \rightarrow \text{Aut}_K(V)$ ein Gruppenhomomorphismus (" K -lineare G -Darstellung")

Beispiel

- $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})^+$
- $K = \mathbb{C}$
- $V =$ meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene

II. Darstellungen und Heckemoduln

Darstellungen

- G eine Gruppe
- K ein Körper
- V ein K -Vektorraum
- $G \rightarrow \text{Aut}_K(V)$ ein Gruppenhomomorphismus (" K -lineare G -Darstellung")

Beispiel

- $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})^+$
- $K = \mathbb{C}$
- $V =$ meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- G -Operation: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ entspricht $f(z) \mapsto f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)$

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Annahme: Für $g \in G$ ist $H/(H \cap gHg^{-1})$ stets endlich.

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Annahme: Für $g \in G$ ist $H/(H \cap gHg^{-1})$ stets endlich.

Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$:

Abbildungen $G \rightarrow K$ mit den folgenden Eigenschaften:

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Annahme: Für $g \in G$ ist $H/(H \cap gHg^{-1})$ stets endlich.

Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$:

Abbildungen $G \rightarrow K$ mit den folgenden Eigenschaften:

- konstant auf jeder Doppelnebenklasse $HgH \in H \backslash G / H$

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Annahme: Für $g \in G$ ist $H/(H \cap gHg^{-1})$ stets endlich.

Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$:

Abbildungen $G \rightarrow K$ mit den folgenden Eigenschaften:

- konstant auf jeder Doppelnebenklasse $HgH \in H \backslash G / H$
- Null außerhalb endlich vieler Doppelnebenklassen

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Annahme: Für $g \in G$ ist $H/(H \cap gHg^{-1})$ stets endlich.

Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$:

Abbildungen $G \rightarrow K$ mit den folgenden Eigenschaften:

- konstant auf jeder Doppelnebenklasse $HgH \in H \backslash G / H$
- Null außerhalb endlich vieler Doppelnebenklassen

Addition: punktweise

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Annahme: Für $g \in G$ ist $H/(H \cap gHg^{-1})$ stets endlich.

Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$:

Abbildungen $G \rightarrow K$ mit den folgenden Eigenschaften:

- konstant auf jeder Doppelnebenklasse $HgH \in H \backslash G / H$
- Null außerhalb endlich vieler Doppelnebenklassen

Addition: punktweise

Faltungsprodukt: $(\varphi * \psi)(g') = \sum_{g \in G/H} \varphi(g) \psi(g^{-1}g')$

Heckemoduln

- V eine K -lineare G -Darstellung
- H eine Untergruppe von G
- Unterraum der H -Invarianten: $V^H = \{v \in V \mid h \cdot v = v \text{ für alle } h \in H\}$

Beachte: Im Allgemeinen ist V^H selbst keine G -Darstellung mehr!

Annahme: Für $g \in G$ ist $H/(H \cap gHg^{-1})$ stets endlich.

Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$:

Abbildungen $G \rightarrow K$ mit den folgenden Eigenschaften:

- konstant auf jeder Doppelnebenklasse $HgH \in H \backslash G / H$
- Null außerhalb endlich vieler Doppelnebenklassen

Addition: punktweise

Faltungsprodukt: $(\varphi * \psi)(g') = \sum_{g \in G/H} \varphi(g) \psi(g^{-1}g')$

$\rightsquigarrow V^H$ ist Heckemodul vermöge $HgH * v = \sum_{h \in H/(H \cap gHg^{-1})} hgv \in V^H$

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ und $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ erfüllen die Annahme

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ und $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ erfüllen die Annahme
- $V^{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}$ ist Heckemodul

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ und $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ erfüllen die Annahme
- $V^{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}$ ist Heckemodul

klassische Heckeoperatoren

entsprechen den Doppelnebenklassen $T_m = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ mit $m \in \mathbb{Z}$

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ und $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ erfüllen die Annahme
- $V^{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}$ ist Heckemodul

klassische Heckeoperatoren

entsprechen den Doppelnebenklassen $T_m = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ mit $m \in \mathbb{Z}$

Darstellungen vs. Heckemoduln – ein Programm

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ und $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ erfüllen die Annahme
- $V^{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}$ ist Heckemodul

klassische Heckeoperatoren

entsprechen den Doppelnebenklassen $T_m = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ mit $m \in \mathbb{Z}$

Darstellungen vs. Heckemoduln – ein Programm

1. Studiere den Übergang $V \mapsto V^H$ von Darstellungen zu Heckemoduln

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ und $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ erfüllen die Annahme
- $V^{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}$ ist Heckemodul

klassische Heckeoperatoren

entsprechen den Doppelnebenklassen $T_m = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ mit $m \in \mathbb{Z}$

Darstellungen vs. Heckemoduln – ein Programm

1. Studiere den Übergang $V \mapsto V^H$ von Darstellungen zu Heckemoduln
2. Untersuche die Struktur der Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$

Beispiel

- V meromorphe Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene
- $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ und $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ erfüllen die Annahme
- $V^{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}$ ist Heckemodul

klassische Heckeoperatoren

entsprechen den Doppelnebenklassen $T_m = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ mit $m \in \mathbb{Z}$

Darstellungen vs. Heckemoduln – ein Programm

1. Studiere den Übergang $V \mapsto V^H$ von Darstellungen zu Heckemoduln
2. Untersuche die Struktur der Heckealgebra $K[H \backslash G / H]$
3. Klassifiziere Heckemoduln bis auf Isomorphie

III. Iwahori-Hecke-Algebren

III. Iwahori-Hecke-Algebren

S_n = Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$

III. Iwahori-Hecke-Algebren

S_n = Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$

- *Erzeuger:* Transpositionen $s_i = (i \ i+1)$ für $1 \leq i \leq n-1$

III. Iwahori-Hecke-Algebren

S_n = Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$

- *Erzeuger:* Transpositionen $s_i = (i \ i+1)$ für $1 \leq i \leq n-1$
- *Relationen:* $s_i^2 = 1$, $s_i s_j = s_j s_i$ für $|i-j| > 1$ und
 $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$ für $1 \leq i < n-1$

III. Iwahori-Hecke-Algebren

S_n = Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$

- *Erzeuger:* Transpositionen $s_i = (i \ i+1)$ für $1 \leq i \leq n-1$
- *Relationen:* $s_i^2 = 1$, $s_i s_j = s_j s_i$ für $|i-j| > 1$ und
 $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$ für $1 \leq i < n-1$

Coxetergruppen

sind Gruppen W mit einer Präsentation der Form

III. Iwahori-Hecke-Algebren

S_n = Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$

- *Erzeuger:* Transpositionen $s_i = (i \ i+1)$ für $1 \leq i \leq n-1$
- *Relationen:* $s_i^2 = 1$, $s_i s_j = s_j s_i$ für $|i-j| > 1$ und
 $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$ für $1 \leq i < n-1$

Coxetergruppen

sind Gruppen W mit einer Präsentation der Form

- *Erzeuger:* $s \in S$ für eine endliche Teilmenge $S \subseteq W$

III. Iwahori-Hecke-Algebren

S_n = Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$

- *Erzeuger:* Transpositionen $s_i = (i \ i+1)$ für $1 \leq i \leq n-1$
- *Relationen:* $s_i^2 = 1$, $s_i s_j = s_j s_i$ für $|i-j| > 1$ und
 $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$ für $1 \leq i < n-1$

Coxetergruppen

sind Gruppen W mit einer Präsentation der Form

- *Erzeuger:* $s \in S$ für eine endliche Teilmenge $S \subseteq W$
- *Relationen:* $s^2 = (ss')^{\text{ord}_W(ss')} = 1$ mit $\text{ord}_W(ss') \geq 2$
für alle $s, s' \in S$ mit $s \neq s'$

III. Iwahori-Hecke-Algebren

S_n = Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$

- *Erzeuger:* Transpositionen $s_i = (i \ i+1)$ für $1 \leq i \leq n-1$
- *Relationen:* $s_i^2 = 1$, $s_i s_j = s_j s_i$ für $|i-j| > 1$ und
 $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$ für $1 \leq i < n-1$

Coxetergruppen

sind Gruppen W mit einer Präsentation der Form

- *Erzeuger:* $s \in S$ für eine endliche Teilmenge $S \subseteq W$
- *Relationen:* $s^2 = (ss')^{\text{ord}_W(ss')} = 1$ mit $\text{ord}_W(ss') \geq 2$
für alle $s, s' \in S$ mit $s \neq s'$

Beispiel: endliche und affine Spiegelungsgruppen

$\mathbb{R}^2$

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

$$W = \langle s_1, s_2, s_3 \rangle \cong D_6 \times \mathbb{Z}^2$$

Weylgruppe des Wurzelsystems A_2

$$W = \langle s_1, s_2 \rangle \cong S_3 \cong D_3$$

affine Weylgruppe des Wurzelsystems G_2

$$W = \langle s_1, s_2, s_3 \rangle \cong D_6 \times \mathbb{Z}^2$$

- (W, S) Coxetersystem

- (W, S) Coxetersystem
- schreibe $w \in W$ als $w = s_1 \cdots s_r$ mit $s_i \in S$ und r minimal

- (W, S) Coxetersystem
- schreibe $w \in W$ als $w = s_1 \cdots s_r$ mit $s_i \in S$ und r minimal
 $\rightsquigarrow \ell(w) = r$ heißt die *Länge* von w

- (W, S) Coxetersystem
- schreibe $w \in W$ als $w = s_1 \cdots s_r$ mit $s_i \in S$ und r minimal
 $\rightsquigarrow \ell(w) = r$ heißt die *Länge* von w
- $\mathbb{Z}[t]$ Polynomring in der Variablen t über $\mathbb{Z}$

- (W, S) Coxetersystem
- schreibe $w \in W$ als $w = s_1 \cdots s_r$ mit $s_i \in S$ und r minimal
 $\rightsquigarrow \ell(w) = r$ heißt die *Länge* von w
- $\mathbb{Z}[t]$ Polynomring in der Variablen t über $\mathbb{Z}$
- setze

$$\mathcal{H}(W, S) = \bigoplus_{w \in W} \mathbb{Z}[t] \cdot T_w$$

freier $\mathbb{Z}[t]$ -Modul mit Basis $(T_w)_{w \in W}$

- (W, S) Coxetersystem
- schreibe $w \in W$ als $w = s_1 \cdots s_r$ mit $s_i \in S$ und r minimal
 $\rightsquigarrow \ell(w) = r$ heißt die *Länge* von w
- $\mathbb{Z}[t]$ Polynomring in der Variablen t über $\mathbb{Z}$
- setze

$$\mathcal{H}(W, S) = \bigoplus_{w \in W} \mathbb{Z}[t] \cdot T_w$$

freier $\mathbb{Z}[t]$ -Modul mit Basis $(T_w)_{w \in W}$

Satz

Auf $\mathcal{H}(W, S)$ gibt es genau eine assoziative $\mathbb{Z}[t]$ -Algebrenstruktur mit

$$T_w T_{w'} = \begin{cases} T_{ww'} & \text{falls } \ell(ww') = \ell(w) + \ell(w') \\ (t-1)T_w + t & \text{falls } w = w' \in S. \end{cases}$$

- (W, S) Coxetersystem
- schreibe $w \in W$ als $w = s_1 \cdots s_r$ mit $s_i \in S$ und r minimal
 $\rightsquigarrow \ell(w) = r$ heißt die *Länge* von w
- $\mathbb{Z}[t]$ Polynomring in der Variablen t über $\mathbb{Z}$
- setze

$$\mathcal{H}(W, S) = \bigoplus_{w \in W} \mathbb{Z}[t] \cdot T_w$$

freier $\mathbb{Z}[t]$ -Modul mit Basis $(T_w)_{w \in W}$

Satz

Auf $\mathcal{H}(W, S)$ gibt es genau eine assoziative $\mathbb{Z}[t]$ -Algebrenstruktur mit

$$T_w T_{w'} = \begin{cases} T_{ww'} & \text{falls } \ell(ww') = \ell(w) + \ell(w') \\ (t-1)T_w + t & \text{falls } w = w' \in S. \end{cases}$$

- $\mathcal{H}(W, S)$ heißt die *Iwahori-Hecke-Algebra* von (W, S)

- (W, S) Coxetersystem
- schreibe $w \in W$ als $w = s_1 \cdots s_r$ mit $s_i \in S$ und r minimal
 $\rightsquigarrow \ell(w) = r$ heißt die *Länge* von w
- $\mathbb{Z}[t]$ Polynomring in der Variablen t über $\mathbb{Z}$
- setze

$$\mathcal{H}(W, S) = \bigoplus_{w \in W} \mathbb{Z}[t] \cdot T_w$$

freier $\mathbb{Z}[t]$ -Modul mit Basis $(T_w)_{w \in W}$

Satz

Auf $\mathcal{H}(W, S)$ gibt es genau eine assoziative $\mathbb{Z}[t]$ -Algebrenstruktur mit

$$T_w T_{w'} = \begin{cases} T_{ww'} & \text{falls } \ell(ww') = \ell(w) + \ell(w') \\ (t-1)T_w + t & \text{falls } w = w' \in S. \end{cases}$$

- $\mathcal{H}(W, S)$ heißt die *Iwahori-Hecke-Algebra* von (W, S)
- Multiplikation bestimmt durch Kombinatorik von (W, S)

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

Bruhat-Zerlegung (Gauss-Algorithmus)

$$G = \dot{\bigcup}_{w \in W} BwB$$

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

Bruhat-Zerlegung (Gauss-Algorithmus)

$$G = \dot{\bigcup}_{w \in W} BwB$$

$\rightsquigarrow$ Heckealgebra $\mathbb{Z}[B \backslash G / B]$ besitzt $\mathbb{Z}$ -Basis $(BwB)_{w \in W}$

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

Bruhat-Zerlegung (Gauss-Algorithmus)

$$G = \dot{\bigcup}_{w \in W} BwB$$

- ↪ Heckealgebra $\mathbb{Z}[B \backslash G / B]$ besitzt $\mathbb{Z}$ -Basis $(BwB)_{w \in W}$
- ↪ Ringstruktur leitet sich aus Gruppenstruktur von W ab

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

Bruhat-Zerlegung (Gauss-Algorithmus)

$$G = \dot{\bigcup}_{w \in W} BwB$$

↪ Heckealgebra $\mathbb{Z}[B \backslash G / B]$ besitzt $\mathbb{Z}$ -Basis $(BwB)_{w \in W}$

↪ Ringstruktur leitet sich aus Gruppenstruktur von W ab:

$$\mathcal{H}(W, S)/(t - q) \cong \mathbb{Z}[B \backslash G / B] \quad \text{via} \quad (f(t) \cdot T_w)_{w \in W} \mapsto (f(q) \cdot BwB)_{w \in W}$$

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

Bruhat-Zerlegung (Gauss-Algorithmus)

$$G = \dot{\bigcup}_{w \in W} BwB$$

↪ Heckealgebra $\mathbb{Z}[B \backslash G / B]$ besitzt $\mathbb{Z}$ -Basis $(BwB)_{w \in W}$

↪ Ringstruktur leitet sich aus Gruppenstruktur von W ab:

$$\mathcal{H}(W, S)/(t - q) \cong \mathbb{Z}[B \backslash G / B] \quad \text{via} \quad (f(t) \cdot T_w)_{w \in W} \mapsto (f(q) \cdot BwB)_{w \in W}$$

- gilt allgemeiner für sogenannte "Gruppen mit BN -Paar"

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

Bruhat-Zerlegung (Gauss-Algorithmus)

$$G = \dot{\bigcup}_{w \in W} BwB$$

↪ Heckealgebra $\mathbb{Z}[B \backslash G / B]$ besitzt $\mathbb{Z}$ -Basis $(BwB)_{w \in W}$

↪ Ringstruktur leitet sich aus Gruppenstruktur von W ab:

$$\mathcal{H}(W, S)/(t - q) \cong \mathbb{Z}[B \backslash G / B] \quad \text{via} \quad (f(t) \cdot T_w)_{w \in W} \mapsto (f(q) \cdot BwB)_{w \in W}$$

- gilt allgemeiner für sogenannte "Gruppen mit BN -Paar"
- affine Spiegelungsgruppen treten über p -adischen Körpern auf, z.B. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p)$

- $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ über endlichem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen
- $W = S_n \hookrightarrow G$ über Permutationsmatrizen: $\sigma \mapsto (\delta_{i\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$
- $B \subseteq G$ Untergruppe der oberen Dreiecksmatrizen

Bruhat-Zerlegung (Gauss-Algorithmus)

$$G = \dot{\bigcup}_{w \in W} BwB$$

↪ Heckealgebra $\mathbb{Z}[B \backslash G / B]$ besitzt $\mathbb{Z}$ -Basis $(BwB)_{w \in W}$

↪ Ringstruktur leitet sich aus Gruppenstruktur von W ab:

$$\mathcal{H}(W, S)/(t - q) \cong \mathbb{Z}[B \backslash G / B] \quad \text{via} \quad (f(t) \cdot T_w)_{w \in W} \mapsto (f(q) \cdot BwB)_{w \in W}$$

- gilt allgemeiner für sogenannte "Gruppen mit BN -Paar"
- affine Spiegelungsgruppen treten über p -adischen Körpern auf, z.B. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p)$
- enge Verknüpfung zur Theorie der Gebäude (Bruhat & Tits)

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

- (i) $|x|_p = 0$ genau dann, wenn $x = 0$,

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

- (i) $|x|_p = 0$ genau dann, wenn $x = 0$,
- (ii) $|xy|_p = |x|_p |y|_p$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$,

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

- (i) $|x|_p = 0$ genau dann, wenn $x = 0$,
- (ii) $|xy|_p = |x|_p |y|_p$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$,
- (iii) $|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ (*starke Dreiecksungleichung*).

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

- (i) $|x|_p = 0$ genau dann, wenn $x = 0$,
- (ii) $|xy|_p = |x|_p |y|_p$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$,
- (iii) $|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ (*starke Dreiecksungleichung*).

Definition

$\mathbb{Q}_p$ = Kompletterung von $\mathbb{Q}$ bzgl. $|\cdot|_p$

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

- (i) $|x|_p = 0$ genau dann, wenn $x = 0$,
- (ii) $|xy|_p = |x|_p |y|_p$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$,
- (iii) $|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ (*starke Dreiecksungleichung*).

Definition

$\mathbb{Q}_p$ = Kompletterung von $\mathbb{Q}$ bzgl. $|\cdot|_p$ heißt *Körper der p -adischen Zahlen*

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

- (i) $|x|_p = 0$ genau dann, wenn $x = 0$,
- (ii) $|xy|_p = |x|_p |y|_p$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$,
- (iii) $|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ (*starke Dreiecksungleichung*).

Definition

$\mathbb{Q}_p =$ Kompletterung von $\mathbb{Q}$ bzgl. $|\cdot|_p$ heißt *Körper der p -adischen Zahlen*

- $\mathbb{Q}_p$ ist lokal kompakter topologischer Körper

Die p -adischen Zahlen

- fixiere Primzahl p
- für $x \in \mathbb{Q}^*$ sei $x = \pm \prod_q q^{n_q}$ mit $n_q \in \mathbb{Z}$ die Primfaktorzerlegung von x
- für $x \in \mathbb{Q}$ setze

$$|x|_p = \begin{cases} p^{-n_p}, & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Der p -adische Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ erfüllt

- (i) $|x|_p = 0$ genau dann, wenn $x = 0$,
- (ii) $|xy|_p = |x|_p |y|_p$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$,
- (iii) $|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ (*starke Dreiecksungleichung*).

Definition

$\mathbb{Q}_p =$ Kompletterung von $\mathbb{Q}$ bzgl. $|\cdot|_p$ heißt *Körper der p -adischen Zahlen*

- $\mathbb{Q}_p$ ist lokal kompakter topologischer Körper
- steht in der Zahlentheorie gleichberechtigt neben $\mathbb{R}$

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$
- $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ ist der Körper mit p Elementen

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$
- $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ ist der Körper mit p Elementen

Betrachte folgende Situation

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}_p) & \xrightarrow{\subseteq} & \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p) = G \\
 \downarrow \pi & & \\
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p) & \xleftarrow{\cong} & B(\mathbb{F}_p) = B \quad \text{obere Dreiecksmatrizen}
 \end{array}$$

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$
- $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ ist der Körper mit p Elementen

Betrachte folgende Situation

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}_p) & \xrightarrow{\subseteq} & \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p) = G \\
 \downarrow \pi & & \\
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p) & \xleftarrow{\cong} & B(\mathbb{F}_p) = B \text{ obere Dreiecksmatrizen}
 \end{array}$$

Iwahori-Hecke-Algebren

- $I = \pi^{-1}(B)$ heißt *Iwahori-Untergruppe* von $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p)$

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$
- $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ ist der Körper mit p Elementen

Betrachte folgende Situation

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}_p) & \xrightarrow{\subseteq} & \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p) = G \\
 \downarrow \pi & & \\
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p) & \xleftarrow{\cong} & B(\mathbb{F}_p) = B \quad \text{obere Dreiecksmatrizen}
 \end{array}$$

Iwahori-Hecke-Algebren

- $I = \pi^{-1}(B)$ heißt *Iwahori-Untergruppe* von $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p)$
- nach Nagayoshi Iwahori (1927–2011)

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$
- $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ ist der Körper mit p Elementen

Betrachte folgende Situation

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}_p) & \xrightarrow{\subseteq} & \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p) = G \\
 \downarrow \pi & & \\
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p) & \xleftarrow{\cong} & B(\mathbb{F}_p) = B \quad \text{obere Dreiecksmatrizen}
 \end{array}$$

Iwahori-Hecke-Algebren

- $I = \pi^{-1}(B)$ heißt *Iwahori-Untergruppe* von $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p)$
- nach Nagayoshi Iwahori (1927–2011)
- Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{Z}[I \backslash G / I]$

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$
- $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ ist der Körper mit p Elementen

Betrachte folgende Situation

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}_p) & \xrightarrow{\subseteq} & \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p) = G \\
 \downarrow \pi & & \\
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p) & \xleftarrow{\cong} & B(\mathbb{F}_p) = B \quad \text{obere Dreiecksmatrizen}
 \end{array}$$

Iwahori-Hecke-Algebren

- $I = \pi^{-1}(B)$ heißt *Iwahori-Untergruppe* von $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p)$
- nach Nagayoshi Iwahori (1927–2011)
- Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{Z}[I \backslash G / I] \cong \mathcal{H}(W, S)/(t - p)$ für geeignetes (W, S)

- $|\cdot|_p$ setzt sich zu Absolutbetrag $|\cdot|_p : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ fort
- $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ ist ein Unterring von $\mathbb{Q}_p$
- $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ ist der Körper mit p Elementen

Betrachte folgende Situation

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}_p) & \xrightarrow{\subseteq} & \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p) = G \\
 \downarrow \pi & & \\
 \mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p) & \xleftarrow{\cong} & B(\mathbb{F}_p) = B \quad \text{obere Dreiecksmatrizen}
 \end{array}$$

Iwahori-Hecke-Algebren

- $I = \pi^{-1}(B)$ heißt *Iwahori-Untergruppe* von $G = \mathrm{SL}_n(\mathbb{Q}_p)$
- nach Nagayoshi Iwahori (1927–2011)
- Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{Z}[I \backslash G / I] \cong \mathcal{H}(W, S)/(t - p)$ für geeignetes (W, S)

N. Iwahori, H. Matsumoto: On some Bruhat decomposition and the structure of the Hecke rings of p -adic Chevalley groups, Publ. Math. IHES **25**, 5–48, (1965)

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

- 3-regulärer zusammenhängender Graph ohne Zyklen

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

- 3-regulärer zusammenhängender Graph ohne Zyklen

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

- 3-regulärer zusammenhängender Graph ohne Zyklen
- Vereinigung affiner reeller Geraden mit Facettenstruktur (*Simplizialkomplex*)

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

- 3-regulärer zusammenhängender Graph ohne Zyklen
- Vereinigung affiner reeller Geraden mit Facettenstruktur (*Simplizialkomplex*)
- trägt Operation von $G = SL_2(\mathbb{Q}_2)$

Bruhat-Tits-Gebäude von $SL_2(\mathbb{Q}_2)$

- 3-regulärer zusammenhängender Graph ohne Zyklen
- Vereinigung affiner reeller Geraden mit Facettenstruktur (*Simplizialkomplex*)
- trägt Operation von $G = SL_2(\mathbb{Q}_2)$
- erlaubt Analyse der Gruppenstruktur von G (Doppelnebenklassen etc.)

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$,
oder lokaler Körper, z.B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{F}_p((t))$

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$,
oder lokaler Körper, z.B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{F}_p((t))$

analytische Invarianten

lineare Gruppen über K ,
verwandte Gruppen und ihre
Darstellungen

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$,
 oder lokaler Körper, z.B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{F}_p((t))$

analytische Invarianten

lineare Gruppen über K ,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

arithmetische Invarianten

die Galoisgruppe $\text{Gal}(\bar{K}|K)$,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$,
 oder lokaler Körper, z.B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{F}_p((t))$

analytische Invarianten

lineare Gruppen über K ,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

arithmetische Invarianten

die Galoisgruppe $\text{Gal}(\bar{K}|K)$,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

- Verallgemeinerung des Modularitätsproblems für elliptische Kurven

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$,
 oder lokaler Körper, z.B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{F}_p((t))$

analytische Invarianten

lineare Gruppen über K ,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

arithmetische Invarianten

die Galoisgruppe $\text{Gal}(\bar{K}|K)$,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

- Verallgemeinerung des Modularitätsproblems für elliptische Kurven
- eindimensionale Darstellungen: Klassenkörpertheorie (Hasse, Artin, Tate)

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$,
 oder lokaler Körper, z.B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{F}_p((t))$

analytische Invarianten

*lineare Gruppen über K ,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen*

arithmetische Invarianten

*die Galoisgruppe $\text{Gal}(\bar{K}|K)$,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen*

- Verallgemeinerung des Modularitätsproblems für elliptische Kurven
- eindimensionale Darstellungen: Klassenkörpertheorie (Hasse, Artin, Tate)
- $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$: Langlands (um 1970)

IV. Anwendungen – Zurück zur Zahlentheorie!

Die Philosophie von Robert Langlands

K = globaler Körper, z.B. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p(t)$,
 oder lokaler Körper, z.B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{F}_p((t))$

analytische Invarianten

lineare Gruppen über K ,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

arithmetische Invarianten

die Galoisgruppe $\text{Gal}(\bar{K}|K)$,
 verwandte Gruppen und ihre
 Darstellungen

- Verallgemeinerung des Modularitätsproblems für elliptische Kurven
- eindimensionale Darstellungen: Klassenkörpertheorie (Hasse, Artin, Tate)
- $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$: Langlands (um 1970)
- zentrales Forschungsgebiet der Zahlentheorie und arithmetischen Geometrie

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$$

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

Moduln M über der Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{C}[I \backslash G / I]$

- $\dim_{\mathbb{C}}(M) < \infty$

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der Iwahori-
Hecke-Algebra $\mathbb{C}[I \backslash G / I]$

- $\dim_{\mathbb{C}}(M) < \infty$

$$V \longmapsto V^I$$

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der Iwahori-
Hecke-Algebra $\mathbb{C}[I \backslash G / I]$

- $\dim_{\mathbb{C}}(M) < \infty$

$$V \longmapsto V^I$$

- ist eine Kategorienäquivalenz (A. Borel 1976)

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der Iwahori-

Hecke-Algebra $\mathbb{C}[I \backslash G / I]$

- $\dim_{\mathbb{C}}(M) < \infty$

$$V \longmapsto V^I$$

- ist eine Kategorienäquivalenz (A. Borel 1976)
- Klassifikation der Heckemoduln durch Kazhdan & Lusztig:
äquivariante K -Homologie von Flaggenvarietäten

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I$ Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der Iwahori-

Hecke-Algebra $\mathbb{C}[I \backslash G / I]$

- $\dim_{\mathbb{C}}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^I$

- ist eine Kategorienäquivalenz (A. Borel 1976)
- Klassifikation der Heckemoduln durch Kazhdan & Lusztig:
äquivariante K -Homologie von Flaggenvarietäten
 $\rightsquigarrow$ lokale Langlandskorrespondenz für obige Darstellungen

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I$ Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der Iwahori-

Hecke-Algebra $\mathbb{C}[I \backslash G / I]$

- $\dim_{\mathbb{C}}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^I$

- ist eine Kategorienäquivalenz (A. Borel 1976)
- Klassifikation der Heckemoduln durch Kazhdan & Lusztig:
äquivariante K -Homologie von Flaggenvarietäten
- $\rightsquigarrow$ lokale Langlandskorrespondenz für obige Darstellungen
und Beweis der Kazhdan-Lusztig-Vermutung

klassischer Fall: Darstellungen mit komplexen Koeffizienten

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I$ Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(V)$

- erzeugt durch V^I
- $\dim_{\mathbb{C}}(V^I) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der Iwahori-

Hecke-Algebra $\mathbb{C}[I \backslash G / I]$

- $\dim_{\mathbb{C}}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^I$

- ist eine Kategorienäquivalenz (A. Borel 1976)
- Klassifikation der Heckemoduln durch Kazhdan & Lusztig:
äquivariante K -Homologie von Flaggenvarietäten
- $\rightsquigarrow$ lokale Langlandskorrespondenz für obige Darstellungen
und Beweis der Kazhdan-Lusztig-Vermutung

D. Kazhdan, G. Lusztig: Proof of the Deligne-Langlands conjecture for Hecke algebras,
Invent. Math. **87**, 153–215, (1987)

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \cong I$$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p \text{ pro-}p \text{ Iwahori-Untergruppe}$$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}
- $\dim_{\mathbb{F}_p}(V^{I_p}) < \infty$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}
- $\dim_{\mathbb{F}_p}(V^{I_p}) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der pro- p -
Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{F}_p[I_p \backslash G / I_p]$

- $\dim_{\mathbb{F}_p}(M) < \infty$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}
- $\dim_{\mathbb{F}_p}(V^{I_p}) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der pro- p -

Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{F}_p[I_p \backslash G / I_p]$

- $\dim_{\mathbb{F}_p}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^{I_p}$

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}
- $\dim_{\mathbb{F}_p}(V^{I_p}) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der pro- p -

Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{F}_p[I_p \backslash G / I_p]$

- $\dim_{\mathbb{F}_p}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^{I_p}$

- Verhalten im Allgemeinen ungeklärt (Ollivier)

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}
- $\dim_{\mathbb{F}_p}(V^{I_p}) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der pro- p -

Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{F}_p[I_p \backslash G / I_p]$

- $\dim_{\mathbb{F}_p}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^{I_p}$

- Verhalten im Allgemeinen ungeklärt (Ollivier)
- Struktur der pro- p Iwahori-Hecke-Algebra: Vignéras (2004)

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}
- $\dim_{\mathbb{F}_p}(V^{I_p}) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der pro- p -

Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{F}_p[I_p \backslash G / I_p]$

- $\dim_{\mathbb{F}_p}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^{I_p}$

- Verhalten im Allgemeinen ungeklärt (Ollivier)
- Struktur der pro- p Iwahori-Hecke-Algebra: Vignéras (2004)
- Klassifikation der einfachen Heckemoduln für GL_n : Ollivier (2010)

neue Entwicklung: Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$

$G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p) \supseteq I \supset I_p$ pro- p Iwahori-Untergruppe

Darstellungen $G \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(V)$

- erzeugt durch V^{I_p}
- $\dim_{\mathbb{F}_p}(V^{I_p}) < \infty$

$\longrightarrow$

Moduln M über der pro- p -

Iwahori-Hecke-Algebra $\mathbb{F}_p[I_p \backslash G / I_p]$

- $\dim_{\mathbb{F}_p}(M) < \infty$

$V \longmapsto V^{I_p}$

- Verhalten im Allgemeinen ungeklärt (Ollivier)
- Struktur der pro- p Iwahori-Hecke-Algebra: Vignéras (2004)
- Klassifikation der einfachen Heckemoduln für GL_n : Ollivier (2010)
- Heckemoduln & Galoisdarstellungen in Charakteristik p :
funktorielle Beziehung via Bruhat-Tits-Gebäude; Große-Klönne (2013)

Weitere Anwendung – Knotentheorie

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i + 1) \in S$

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i + 1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \end{array} \right\} \text{ in } W$$

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i+1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \end{array} \right\} \text{ in } W$$

$$\left. \begin{array}{l} T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array} \right\} \text{ in } \mathcal{H}(W, S)$$

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i + 1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \\ T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in } W \\ \\ \text{in } \mathcal{H}(W, S) \end{array} \right\} \text{Zopfrelationen}$$

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i+1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \\ T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in } W \\ \\ \text{in } \mathcal{H}(W, S) \end{array} \right\} \text{Zopfrelationen}$$

Zopfgruppe B_n

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i + 1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \\ T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in } W \\ \\ \text{in } \mathcal{H}(W, S) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \\ T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array}} \right\} \text{Zopfrelationen}$$

Zopfgruppe B_n

algebraisch: Gruppe mit $n - 1$ Erzeugern & Zopfrelationen

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i + 1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \\ T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in } W \\ \\ \text{in } \mathcal{H}(W, S) \end{array} \right\} \text{Zopfrelationen}$$

Zopfgruppe B_n

algebraisch: Gruppe mit $n - 1$ Erzeugern & Zopfrelationen

topologisch: Fundamentalgruppe eines n -Konfigurationsraums

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i+1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \\ T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in } W \\ \\ \text{in } \mathcal{H}(W, S) \end{array} \right\} \text{Zopfrelationen}$$

Zopfgruppe B_n

algebraisch: Gruppe mit $n - 1$ Erzeugern & Zopfrelationen

topologisch: Fundamentalgruppe eines n -Konfigurationsraums,
Abbildungsklassengruppe der n -punktigen Kreisscheibe

Weitere Anwendung – Knotentheorie

$W = S_n =$ symmetrische Gruppe mit Erzeugern $s_i = (i \ i+1) \in S$;
für $|i - j| > 1$ gilt

$$\left. \begin{array}{l} s_i s_j = s_j s_i \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \\ T_i T_j = T_j T_i \\ T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in } W \\ \text{in } \mathcal{H}(W, S) \end{array} \right\} \text{Zopfrelationen}$$

Zopfgruppe B_n

algebraisch: Gruppe mit $n - 1$ Erzeugern & Zopfrelationen

topologisch: Fundamentalgruppe eines n -Konfigurationsraums,
Abbildungsklassengruppe der n -punktigen Kreisscheibe

erhalten Ringhomomorphismen

$$\mathbb{Z}[t^{\pm 1}][B_n] \twoheadrightarrow \mathcal{H}(W, S)[t^{-1}] \twoheadrightarrow \mathbb{Z}[W]$$

=

=

=

=

Punkte identifizieren

Punkte identifizieren

- Verschlingung

Punkte identifizieren

- Verschlingung
- manchmal Knoten (falls zusammenhängend)

=

=

Punkte identifizieren

- Verschlingung
- manchmal Knoten (falls zusammenhängend)
- Iwahori-Hecke-Algebra $\rightsquigarrow$ Invariante

- Verschlingung
- manchmal Knoten (falls zusammenhängend)
- Iwahori-Hecke-Algebra $\rightsquigarrow$ Invariante

Jones-Conway-Polynom einer Verschlingung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!